



### Información del medicamento

#### **Ingrediente activo (en cada parche [sistema transdérmico])**

Oxibutinina 3.9 mg/día ..... Tratamiento para vejigas hiperactivas

#### **Propósito**

#### **Uso**

- trata la vejiga hiperactiva de mujeres
- es posible que tenga vejiga hiperactiva si ha tenido 2 o más de los siguientes síntomas durante **al menos 3 meses**:
  - polaquiuria (la necesidad de orinar con más frecuencia de lo habitual; por lo general, más de 8 veces en 24 horas)
  - necesidad imperiosa de orinar (una gran necesidad de orinar inmediatamente)
  - incontinencia urinaria de urgencia (tener pérdidas o mojarse si no puede controlar la necesidad imperiosa de orinar)
- también existen tratamientos no farmacológicos que pueden ayudarle (consulte el prospecto de información para el consumidor que encontrará dentro del envase)

#### **Advertencias**

##### Para uso externo solamente

La micción frecuente también puede ser provocada por:

- infecciones del tracto urinario (ITU)
  - diabetes
  - embarazos a temprana edad
  - otras afecciones más graves
- Si piensa que podría tener una de estas afecciones, es importante que consulte a un médico antes de usar el parche.

Podría experimentar somnolencia, mareos y visión borrosa. No conduzca ni opere maquinaria hasta que sepa de qué manera la afecta el parche.

##### No lo utilice si:

- tiene **alguno** de estos síntomas, que podrían ser signo de ITU u otra afección grave.  
Consulte a su médico lo antes posible si usted tiene:
  - dolor o ardor al orinar. Estos síntomas también podrían estar acompañados de fiebre o escalofríos.
  - sangre en la orina
  - dolor en la parte inferior de la espalda o los costados sin motivo aparente
  - orina turbia o con olor desagradable
- es hombre. Sus síntomas pueden ser causa de una afección más grave.
- tiene menos de 18 años de edad. Se desconoce si es eficaz o seguro para los niños.
- solo pierde orina accidentalmente al toser, estornudar o reírse; es posible que tenga incontinencia urinaria de esfuerzo. Este producto no funcionará para esa afección.

### Información del medicamento (continuación)

- se le ha diagnosticado de retención urinaria (no puede vaciar la vejiga) por parte de un médico
- se le ha diagnosticado de retención gástrica (el estómago se vacía lentamente después de una comida) por parte de un médico
- tiene glaucoma
- es alérgica a la oxibutinina

#### Consulte a un médico antes de usar si tiene

- síntomas de diabetes, como:
  - sed excesiva
  - hambre extrema
- pérdida de peso sin motivo aparente
- enfermedad hepática o renal

#### Consulte a un médico o farmacéutico antes de usar si está tomando

- un medicamento recetado para vejigas hiperactivas
- algún medicamento que pueda provocarle somnolencia, mareos, sequedad bucal, estreñimiento o visión borrosa
- ciertos antibióticos (por ejemplo, eritromicina, claritromicina) o antifúngicos recetados (por ejemplo, ketoconazol, itraconazol)

#### Al utilizar este producto

- podría tener picazón, sarpullido o enrojecimiento en el lugar donde se colocó el parche
- podría aumentar la somnolencia si toma alcohol

#### Interrumpa su uso y consulte a un médico si

- no puede vaciar la vejiga (retención urinaria)
- la afección empeora o aparecen nuevos síntomas
- la afección no mejora después de 2 semanas de uso
- tiene una reacción alérgica a este producto
- tiene enrojecimiento, picazón o ampollas importantes en el lugar de la aplicación

**Si está embarazada o amamantando, consulte a un profesional de la salud antes de usar este producto.**

**Mantener fuera del alcance de los niños.** Si se traga, obtenga ayuda médica o comuníquese de inmediato con el Servicio de Toxicología.

### Información del medicamento (continuación)

#### **Modo de uso**

Mujeres de 18 años o más:

##### Cómo usar el parche:

- abra 1 bolsa y aplíquese el parche de inmediato en un área limpia, seca y lisa de la piel del abdomen, las caderas o las nalgas. No se coloque el parche sobre áreas grasosas, dañadas (cortadas o raspadas) ni irritadas (sarpullido) de la piel. No se coloque el parche si la piel tiene aceite, loción o polvos ya que estos podrían impedir que el parche se adhiera a la piel.
- use el parche debajo de la ropa y no lo exponga a la luz solar
- no corte el parche en partes más pequeñas
- use solo 1 parche a la vez durante 4 días consecutivos
- después de 4 días, quítese el parche usado y aplíquese uno nuevo
- cámbiese el parche cada 4 días durante el tiempo que utilice este producto
- cada vez que se coloque un parche nuevo, cambie el lugar de colocación (*es decir, abdomen, caderas o nalgas*)
- si se le cae un parche y no puede volver a colocárselo en la piel, use uno nuevo

##### Cómo desechar un parche usado:

- cuando se quite un parche usado, dóblelo por la mitad con las partes adherentes juntas
- deshágase del parche para que no lo use ni lo trague otra persona, en especial un niño, o una mascota

#### **Otra información**

- el producto viene en bolsas individuales selladas; no utilizar si la bolsa está rota o abierta
- almacenar entre 20 °C y 25 °C (68 °F a 77 °F)
- proteger de la humedad
- no almacenar afuera de la bolsa sellada

#### **Ingredientes inactivos**

adhesivo acrílico, película de poliéster/etileno acetato de vinilo, película de poliéster siliconado y triacetina

#### **¿Tiene preguntas o comentarios?**

Llame sin cargo: **1-888-OXYTROL (1-888-699-8765)** de lunes a viernes entre las 8:00 a. m. y las 5:00 p. m., hora estándar del centro